



Isótopos Estables y Dieta en Poblaciones Prehispánicas del Norte Semiárido (30°-32° lat. S.): una Primera Aproximación desde el Arcaico Tardío hasta el Período Incaico

CATEGORÍA

Publicaciones

AUTORÍA

Cristian Becker, Marta Alfonso, Nicole Misarti, Andrés Troncoso, Pablo Larach

FECHA

2015-12-28

RESUMEN

En este trabajo se presentan los resultados de análisis isotópicos realizados sobre muestras humanas de las cuencas hidrográficas de los ríos Choapa y Limarí que cubren un lapso entre el Arcaico tardío (ca 2000 a.C.) y el período Inkaico (1450 d.C. - 1540 d.C.). Estos resultados muestran que, a diferencia de lo tradicionalmente planteado, se reconoce que el consumo de maíz (*Zea mays*) se hace frecuente en la zona hacia el período Intermedio Tardío (ca. 1000 d.C - 1450 d.C.) y no en tiempos previos. Por el contrario, la comparación de los valores isotópicos entre los grupos Arcaico Tardío y las primeras poblaciones con cerámica del Período Alfarero Temprano no muestran diferencias significativas en sus valores. Estos resultados se contextualizan dentro de la problemática regional asociada a la adopción de la agricultura.

FUENTE DE INFORMACIÓN

[Boletín Museo Nacional de Historia Natural](#)

INSTITUCIÓN

[Museo Nacional de Historia Natural](#)

UBICACIÓN

[Interior Parque Quinta Normal, Santiago, Región Metropolitana, Chile](#)