



Ficha Boletín 34 (1975) Artículo 03 : Desarrollo larvario de Elminius kingii Gray (CRUSTACEA, CIRRIPIEDIA)

Recursos

CATEGORÍA

Estudios e informes

AUTORÍA

Museo Nacional de Historia Natural

FECHA

1975

RESUMEN

El género *Elminius* (dos o tres especies) presentaba una distribución disyuntiva limitada al hemisferio sur, en Australasia y Sudamérica, hasta alrededor de 1945, época en que la especie *Elminius modestus* DARWIN, originaria de Australasia, fue introducida posiblemente por barcos en Inglaterra (Southampton y /o estuario del Támesis); desde allí se ha expandido rápidamente, según CRISP (1958, 1960), CRISP y SOUTHWARD (1959), BARNES y BARNES (1960), entre otros, convirtiéndose en una peste para los bancos de ostras (KNIGHT-JONES 1948) debido en parte a su comportamiento gregario durante la etapa de fijación al substrato (KNIGHT-JONES y STEVENSON 1950).

FUENTE DE INFORMACIÓN

[Museo Nacional de Historia Natural](#)

INSTITUCIÓN

[Museo Nacional de Historia Natural](#)

UBICACIÓN

[Interior Parque Quinta Normal, Santiago, Región Metropolitana, Chile](#)