



Ficha Boletín 38 (1981) Artículo 06 : Distribución y ambientes de *Batrachyla taeniata* (Girard) en Chile, (Anura Leptodactylidae)

Recursos

CATEGORÍA

Estudios e informes

AUTORÍA

Museo Nacional de Historia Natural

FECHA

1981

RESUMEN

Batrachyla taeniata se distribuye en un rango norte-sur de 1570 km entre las latitudes 32° 54' y 45° 25' Sur. Damos a conocer 13 localidades nuevas, 8 en el sector norte y 5 en el Bosque Temperado Austral. Las poblaciones nuevas del norte están asociadas con la estepa de Acacia. Los límites de la distribución actual parecen determinados por restricciones sobre el proceso reproductivo, ejercidos por el total de las precipitaciones anuales en el norte y por las temperaturas mínimas en el sur. Las poblaciones de *B. taeniata* son más frecuentes entre Concepción y Puerto Montt (37° a 42° S) y la Isla de Chiloé (42° a 43° S).

FUENTE DE INFORMACIÓN

[Museo Nacional de Historia Natural](#)

INSTITUCIÓN

[Museo Nacional de Historia Natural](#)

UBICACIÓN

[Interior Parque Quinta Normal, Santiago, Región Metropolitana, Chile](#)