




Boletín 67(1): 25-31 (2018) Cotoras

Recursos

CATEGORÍA

Estudios e informes

AUTORÍA

Museo Nacional de Historia Natural

FECHA

2018

RESUMEN

La insularidad promueve divergencia dietaria en vertebrados debido a cambios en los parámetros bióticos así como la competencia intraespecífica, depredación y la disponibilidad de recursos. *Liolaemus pictus* es una especie de lagartija del sur de Chile con poblaciones en territorio continental e insular. El objetivo de este trabajo es probar la correlación entre las preferencias dietarias y las diferencias morfológicas entre las poblaciones continentales e insulares en esta especie. Los resultados no mostraron diferencias en la composición de la dieta, pero la proporción del consumo de Coleoptera e Hymenoptera es más alta en continente. La herbivoría está presente en ambas poblaciones y no hay relación entre la dieta y la morfología. La presencia de herbivoría podría estar relacionada con la reducida disponibilidad de presas, condición que podría estar presente en islas y en ambientes de altura. Palabras clave: Dieta; Herbivoría; Insularidad; Morfología; Poblaciones.

FUENTE DE INFORMACIÓN

[Museo Nacional de Historia Natural](#)

INSTITUCIÓN

[Museo Nacional de Historia Natural](#)