





*Paronychia (?) manicata* ♀♂

S. Ambrosio, Plano Tijeretas, 330 m, 5.11.60

Stängel nur 20 cm bis 1.90 m hoch, gewöhnlich nur 1 m hoch. Frühe des Blütes und Blütengewebe erhalten, eine junge Pflanze ist dabei.

Auf der ganzen Korkeloberfläche häufig an den Abhängen kommt sie nicht vor (auch bei Los Hornos, nur ein Exemplar auf nur 50 m Höhe).

Der Stamm wird kaum über 2 cm dick und ist typisch distomatoid verzweigt.

Aus S. Nov. nur ein einziges bleibendes Exemplar gefunden.

Kuschel

Plantae in Insula San Ambrosio (Chile) anno 1960 lectae.

10. *Sanctambrosia manicata* Skottsb. S.K.

Plano Tijeretas, 330 m d. n.

5.11.60.

Leg. Guillermo Kuschel.

HERBARIO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, CHILE

Tijeretas 1960 V-72

**Sanctambrosia manicata Skottsb.**

## IDENTIFICACIÓN

Sanctambrosia manicata Skottsb. (CARYOPHYLLACEAE), verificado por Muñoz C, 1972;  
Sanctambrosia manicata Skottsb. (CARYOPHYLLACEAE), verificado por Skottsberg, sin fecha;  
Spergularia manicata (Skottsb.) Kool & Thulin (CARYOPHYLLACEAE), verificado por Arriagada J, 2025

## FAMILIA

CARYOPHYLLACEAE

## RECOLECTADOR POR

Kuschel G, n° 10

## FECHA DE RECOLECTA

05/11/1960

## LUGAR DE COLECTA

Isla San Ambrosio, Plano Tijeretas., Valparaíso, Chile.

## FUENTE DE INFORMACIÓN

[Herbario Museo Nacional de Historia Natural](#)

## INSTITUCIÓN

[Museo Nacional de Historia Natural](#)

## UBICACIÓN

[Interior Parque Quinta Normal, Santiago, Región Metropolitana, Chile](#)