



000 180882 15 67

BREVE HISTORIA DE LA PSIQUIATRIA BIOLOGICA

Con motivo del lanzamiento del libro *Progresos en psiquiatría biológica* (Ed. Universidad Católica de Chile, Santiago, 1990), del que son editores los doctores Hernán Silva I. y César Carvajal A., el Dr. César Ojeda Figueroa leyó un discurso de presentación que reseña con gran claridad la historia de la psiquiatría biológica en este siglo y el significado de esta obra. *Creces* reproduce este texto del Dr. Ojeda, con mínimas modificaciones.

Dr. César Ojeda Figueroa



La información farmacológica y biológica en psiquiatría, especialmente durante los últimos veinte años, es abrumadora. Tanto en su abundancia como en su complejidad. Bajo una mirada superficial este no parece diferir de lo ocurrido en el resto de la medicina. Sin embargo, basta retroceder algunos años para comprender el impacto que ella ha significado para los psiquiatras. Mientras los Boates almorzaban sus guillemas en Liverpool, recién aparecía en el mercado el Diazepam. Y mientras se desarrollaba el movimiento estudiantil de Mayo de 1968 en Francia, faltaba aún casi una década para que se descubriera el complejo receptor benzodiazepínico-GABA.

En el año 1974, en una reunión en la Clínica Psiquiátrica Universitaria, un desahogado colega presentaba la evidencia que lo hacía concluir que no tratar a los pacientes que padecían de Enfermedad Maníaco-Depresiva con Carbonato de Litio era una grave e inexcusable negligencia médica.

Hasta fines de 1950 los tratamientos somáticos en psiquiatría

eran muy limitados, e incluían prescripciones dietéticas, sangrías, hidratación y el uso de sustancias como iudano, alcanfor, belladona, bromuros, y algunos barbitúricos como el veronal y el gardenal.

Las primeras terapéuticas eficaces fueron los métodos conocidos con el nombre de "chocques". En 1917, en Viena, Wagner von Jauregg trata la Parálisis General Síptica mediante la inoculación del paludismo (malariaoterapia). En 1937, Manfred Sakel, también en Viena, propone la cura insulínica: la hipoglucemia inducida producía un coma que podía ser interrumpido con la administración de glucosa. Los comas insulínicos se demostraron eficaces en algunas formas de esquizofrenia y en las toxicomanías. En 1936, von Meduna, en Budapest, utilizó el choque convulsivo, a través de la inyección endovenosa de aceite alcanforado, el cardiazol. En 1938, en Roma, Ugo Cerletti y su colaborador Sinigaglia proponen sustituir el cardiazol por la corriente eléctrica, con lo que se consiguen impresionantes resultados, especialmente en el tratamiento de la Melancolía.

Sin embargo, la psicofarmacología moderna se inicia en 1950, al sintetizar Charpentier la Clorpromazina. Este neuroleptico fue introducido en 1952 en psiquiatría, y se comprobó su potente efecto antipsicótico.

CRECES 55

1990, N. 3760, 2237, 1180

Breve historia de la psiquiatría biológica [artículo] César Ojeda Figueroa.

AUTORÍA

Ojeda Figueroa, César

FECHA DE PUBLICACIÓN

1990

FORMATO

Artículo

DATOS DE PUBLICACIÓN

Breve historia de la psiquiatría biológica [artículo] César Ojeda Figueroa. retr.

FUENTE DE INFORMACIÓN

[Biblioteca Nacional Digital](#)

INSTITUCIÓN

[Biblioteca Nacional](#)

UBICACIÓN

Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 651, Santiago, Región Metropolitana, Chile