




Distribución y ambientes de *Batrachyla taeniata* (Girard) en Chile, (Anura Leptodactylidae)

Recursos

CATEGORÍA

Publicaciones

AUTORÍA

Michel Sallaberry, José Valencia, Nelson Díaz

FECHA

1981-12-28

RESUMEN

Batrachyla taeniata se distribuye en un rango norte-sur de 1570 km entre las latitudes 32° 54' y 45° 25' Sur. Damos a conocer 13 localidades nuevas, 8 en el sector norte y 5 en el Bosque Temperado Austral. Las poblaciones nuevas del norte están asociadas con la estepa de Acacia. Los límites de la distribución actual parecen determinados por restricciones sobre el proceso reproductivo, ejercidos por el total de las precipitaciones anuales en el norte y por las temperaturas mínimas en el sur. Las poblaciones de *B. taeniata* son más frecuentes entre Concepción y Puerto Montt (37° a 42° S) y la Isla de Chiloé (42° a 43° S).

FUENTE DE INFORMACIÓN

[Boletín Museo Nacional de Historia Natural](#)

INSTITUCIÓN

[Museo Nacional de Historia Natural](#)

UBICACIÓN

[Interior Parque Quinta Normal, Santiago, Región Metropolitana, Chile](#)