



## **Ficha Boletín 1 (1908-1910) Artículo 05 : Fósiles del morro de Arica**

**Recursos**

### **CATEGORÍA**

Estudios e informes

## **AUTORÍA**

Museo Nacional de Historia Natural

## **FECHA**

1908-1910

## **RESUMEN**

Latitud 18° 29' S. long. 70° 20' O El examen de estas conchas confirma plenamente la opinión, ya aceptada, de la existencia de rocas jurásicas en la América del Sur. La forma más característica de estos fósiles es una valva de Braquiópodo, bien conservada, perteneciente al género *Rhynchonella*, que por su forma y estructura parece ser la *Rhynchonella tetrahedra*, especie característica del terreno liásico europeo, y que he encontrado igualmente en las margas calcáreas de Manflas (valle de Copiapó) del Lías superior. En la especie del Morro los pliegues laterales se hallan encorvados y están separados de los de la región media por una área llana, como en la *Rhynchonella tetrahedra*.

## **FUENTE DE INFORMACIÓN**

[Museo Nacional de Historia Natural](#)

## **INSTITUCIÓN**

[Museo Nacional de Historia Natural](#)

## **UBICACIÓN**

[Interior Parque Quinta Normal, Santiago, Región Metropolitana, Chile](#)