





MUSEO NACIONAL DE
HERBARIO
143170
CHILE
HISTORIA NATURAL

Paronychia (?) manicata ♀♂
S. Ambrosio, Plano Tijeretas, 330 m, 5.11.60
Stamm um 20 cm bis 1.90 m hoch, gewöhlich um 1 m hoch. Frühe des Blütes und Blütengewebe erhalten, eine junge Pflanze ist dabei.
Auf der ganzen Korkbark häufig, an den Abhängen kommt sie nicht vor (auch bei Los Hornos, nur ein Exemplar auf nur 50 m Höhe).
Der Stamm wird kaum über 2 cm dick und ist typisch distomisch verzweigt.
Am 5. Nov. nur ein einziges blühendes Exemplar gefunden.
Kuschel

Plantae in Insula San Ambrosio (Chile) anno 1960 lectae.
10. *Sanctambrosia manicata* Skottsb.
S.G.
Plano Tijeretas, 330 m d. n.
5.11.60.
Leg. Guillermo Kuschel.

HERBARIO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, CHILE
Tijeretas C.M.P.V.-72

Sanctambrosia manicata Skottsb.

IDENTIFICACIÓN

Sanctambrosia manicata Skottsb. (CARYOPHYLLACEAE), verificado por Muñoz C, 1972;
Sanctambrosia manicata Skottsb. (CARYOPHYLLACEAE), verificado por Skottsberg, sin fecha;
Spergularia manicata (Skottsb.) Kool & Thulin (CARYOPHYLLACEAE), verificado por Arriagada J,
2025

ÁREAS DE LA COLECCIÓN

CARYOPHYLLACEAE

RECOLECTADOR POR

Kuschel G, n° 10

FECHA DE RECOLECTA

05/11/1960

LUGAR DE COLECTA

Isla San Ambrosio, Plano Tijeretas., Valparaíso, Chile.

FUENTE DE INFORMACIÓN

[Herbario Museo Nacional de Historia Natural](#)

INSTITUCIÓN

[Museo Nacional de Historia Natural](#)